

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ

26.02.2019

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению
лекарственного препарата Глютанол-С

(Организация-разработчик: ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, 4-Б)

Номер регистрационного
удостоверения 12-3-2.14-1856№ПВР-3-2.14/03006

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Глютанол – С (Glutanol-C);
международное непатентованное наименование: глюкоза, этанол,
аскорбиновая кислота.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Глютанол - С в 100 мл в качестве действующих веществ содержит:
глюкозу - 20 г, этиловый спирт – 15 г, аскорбиновую кислоту – 0,5 г, а в качестве
вспомогательного вещества воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость с
желтоватым оттенком с запахом спирта.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения
в закрытой упаковке - 2 года со дня производства, после первого вскрытия
флакона использовать в течение 14 дней при условии хранения при температуре
от 4 °С до 6 °С.

Запрещается применять Глютанол - С по истечении срока годности.

4. Глютанол - С выпускают расфасованным по 50 и 100 мл в стеклянные
флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками,
укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая потребительская упаковка
лекарственного препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Глютанол – С хранят в закрытой упаковке производителя в защищённом
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при
температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Глютанол - С следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Глютанол - С относится к фармакотерапевтической группе: другие органотропные средства в комбинациях.

10. Глютанол - С повышает осмотическое давление крови, активизирует процессы обмена веществ в тканях, усиливает сократительную способность сердечной мышцы, расширяет сосуды, улучшает антитоксическую функцию печени, стимулирует синтез гормонов и ферментов, повышает защитные силы организма животных.

По степени воздействия на организм Глютанол - С относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Глютанол – С применяют животным в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с Глютанолом - С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу, после работы следует тщательно вымыть с мылом руки.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Глютанолом - С. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Глютанол – С не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

15. Глютанол - С применяют внутривенно или перорально.

Препарат вводят животным один раз в сутки в течение 3-4 дней в следующих дозах (мл на животное):

Вид животного	Способ введения	
	перорально	внутривенно
лошади	500-700	70-120
крупный рогатый скот	400-500	80-100
телята	200-300	30-50
свиньи	200-300	-
поросята	20-50	-

Собакам лекарственный препарат вводят перорально или внутривенно в дозе 0,2-1,0 мл/кг массы.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций, использование лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки препарата не установлены.

18. Глютанол - С запрещается смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска введения очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Глютанаола-С в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя

ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б