

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР

Труда
ОАО «Мобилсервис»



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ
09.08.2019



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Пелтамаст

(Организация-разработчик ООО НПП «Агрофарм»; Россия,
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к.18)

Номер регистрационного удостоверения 15-3-3.15-3349№ПВР-3-2.0/02519

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование - Пелтамаст (Peltamastum);
международные непатентованные наименования действующих веществ:
неомицин и доксициклин.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Пелтамаст в качестве действующих веществ содержит неомицина сульфат – 6,6 мг/мл и доксициклина гидрохлорид – 19,9 мг/мл, а также вспомогательные вещества: воск эмульсионный, алюминия стеарат, магния окись, масло вазелиновое.

3. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую суспензию желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.

Запрещается применение Пелтамаста по истечении срока годности.

4. Пелтамаст выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из оранжевого стекла, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками; по 10 мл в шприцы-дозаторы однократного использования, снабженные канюлей для интрацистернального введения, закупоренные защитными колпачками. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Пелтамаст хранят в закрытой упаковке производителя, в защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

После вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит.

6. Пелтамаст следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается Пелтамаст без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Пелтамаст относится к фармакотерапевтической группе - аминогликозиды в комбинациях.

10. Неомицина сульфат и доксициклина гидрохлорид, входящие в состав препарата, обеспечивают широкий спектр его антимикробной активности.

Неомицина сульфат – аминогликозидный антибиотик, эффективен в отношении ряда грамположительных (стафилококки, пневмококки) и грамотрицательных

(кишечная палочка, палочка дизентерии, протей и др.) микроорганизмов. Не активен в отношении анаэробов. Механизм его действия заключается в связывании со специфическими рецепторами бактериальных рибосом и нарушением синтеза цитоплазматических мембран, приводящим к гибели бактериальных клеток.

Доксициклина гидрохлорид – полусинтетическое производное окситетрациклина, эффективен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В основе его антибактериального действия лежит подавление белкового синтеза микробной клетки на уровне рибосом.

Благодаря комбинированному действию доксициклина гидрохлорида и неомидина, и специальной основы, наблюдается пролонгированное антибактериальное действие препарата в течение 6 недель.

Пелтамаст по степени воздействия на организм относится к веществам «малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). При интрацистернальном введении в молочную железу клинически здоровых коров препарат вызывает незначительное, быстро проходящее раздражение тканей вымени.

III. Порядок применения

11. Пелтамаст применяют с лечебно-профилактической целью при мастите коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению Пелтамаста является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

В связи с выделением препарата с молоком, запрещается применение Пелтамаста дойным коровам, а также стельным коровам менее чем за 49 суток до предполагаемого отела (начала лактации).

13. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Пелтамаста следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пелтамастом. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Пелтамаст не предназначен для применения лактирующим коровам. Применение препарата коровам в период стельности разрешается не позднее, чем за 49 суток до предполагаемого отела.

15. Пелтамаст вводят коровам сразу после завершения лактационного периода (после последней дойки) во все четверти вымени, однократно в дозе 10 мл в каждую четверть.

Перед введением препарата молоко из всех четвертей выдаивают, а сосок дезинфицируют 70 % раствором этилового спирта, Пелтамаст подогревают до 36–39 °С и взбалтывают. При использовании шприца-дозатора его канюлю плотно прижимают к отверстию соскового канала и вводят препарат. Из флакона препарат набирают стерильным шприцем и вводят в сосок при помощи стерильного катетера. После введения проводят легкий массаж вымени снизу-вверх.



