СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К.А. САВЕНКОВ
20 СЕН 2022

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению АСД фракции 3

(Организация-разработчик: ФКП «Армавирская биофабрика», адрес: 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Прогресс, ул. Мечникова, дом 11)

Номер регистрационного удостоверения: 02-3-31.12-2353№ПВР-3-1.2/00911

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АСД фракция 3 (ASD fraction 3).

Международное непатентованное наименование: отсутствует.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного и внутриматочного применения.

АСД фракция 3 содержит в своем составе комплекс биологических веществ, в том числе карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, алифатические амины и амиды, а также соединения с активной сульфгидрильной группой и воду.

3. По внешнему виду препарат представляет собой густую жидкость от темно-коричневого до черного цвета со специфическим запахом.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 4 года с даты производства. Срок годности после вскрытия флакона - не более 14 суток.

Запрещается применение АСД фракция 3 по истечении срока годности.

4. Выпускают АСД фракция 3 расфасованным по 100, 200 мл в полимерные или стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят транспортируют лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 10 ^{0}C до 30 ^{0}C.

6. АСД фракцию 3 следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Препарат АСД фракция 3 отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: иммуностимуляторы для ветеринарного применения.

10. АСД фракция 3 относится к тканевым препаратам. Биологически активные вещества, входящие в состав препарата АСД фракция 3, оказывают антисептическое и противовоспалительное действие, стимулируют активность

ретикулоэндотелиальной системы, нормализуют трофику и ускоряют регенерацию поврежденных тканей.

АСД фракция 3 по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. АСД фракция 3 назначают животным для лечения инфицированных вяло заживающих ран, дерматитов, хронических воспалительных поражений кожи и копыт, трофических язв, свищей, копытной гнили овец и некробактериоза животных, а также гинекологических заболеваний различной этиологии.

12. Запрещается применение АСД франции 3 при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При работе с АСД фракция 3 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АСД фракцией 3. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата животным в период беременности и лактации, а также их потомству определяет лечащий врач на основании оценки соответствия пользы к возможному риску его применения.

15. При гинекологических заболеваниях АСД фракцию 3 применяют при вагинитах интравагинально, а эндометритах — внутриматочно в виде 20-50% масляных растворов, при заболеваниях кожи и копыт — наружно в нативном виде или в форме масляных растворов и мазей. Масляные растворы препарата готовят в асептических условиях с использованием касторового, льняного, подсолнечного, минерального масел, в которые при тщательном перемешивании добавляют АСД фракцию 3 в соотношении 1:1 при тяжелой степени заболевания или 1:5 при средней и легкой степени заболевания.

При лечении инфицированных вяло заживающих ран и свищей, проводят санитарную обработку пораженного участка до полного удаления гнойного экссудата, и после этого накладывают смоченную 20% масляным раствором АСД фракции 3 марлевую салфетку, которую фиксируют бинтом. Смену салфеток с лекарственным препаратом проводят ежедневно в течение 5-7 дней до выздоровления животного.

При экземах, пролежнях, дерматитах, хронических воспалительных поражениях кожи, пиодермии и трофических язвах на пораженные участки кожи наносят стерильные масляные растворы препарата 20% при легкой и средней степени заболевания, а 50% при тяжелой степени заболевания один раз в сутки, с

захватом 2-3 см здоровой кожи (с целью предупреждения распространения очага воспаления). Лечение проводят в течение 6-10 дней до выздоровления животного.

При обширных поражениях препарат наносят попеременно на разные участки, покрывая за одну обработку не более 1/10 поверхности тела животного.

При некробактериозе животных и копытной гнили овец после санитарной обработки пораженных участков конечностей их смазывают препаратом в нативном виде один раз в день курсами 10 дней, 2 дня перерыв до выздоровления животного. Лечение проводят в комплексе с местными хирургическими обработками и лекарственными средствами специфической и симптоматической терапии.

При вагинитах, эндометритах, пиометре, вызванных трихомонозом или патогенной микрофлорой коровам вводят во влагалище 20% масляный раствор препарата при помощи шприца Жане с катетером. На одну процедуру расходуют до 300 мл раствора. Рекомендуется также во влагалище вводить марлевые тампоны, пропитанные раствором. Лечение проводят 1 раз в день в течение 6-10 дней до выздоровления.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При попадании на участки здоровых тканей большого количества нативного препарата возможно выраженное раздражение тканей вплоть до ожога. В этом случае необходимо удалить с поверхности ватно-марлевым тампоном остатки препарата и обильно промыть не менее 3-х раз водой.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Применение АСД фракции 3 не исключает использование других лекарственных препаратов.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в тех же дозировках по той же схеме.

21. Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных во время и после применения препарата АСД фракция 3, используются в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные АСД фракцией 3 участки туши зачищают и утилизируют.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ФКП «Армавирская биофабрика», 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Прогресс, ул. Мечникова, дом 11.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ФКП «Армавирская биофабрика», 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Прогресс, ул. Мечникова, дом 11.

Директор ФКП «Армавирская биофабрика» Е.В. Сусский